

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ КОРРЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОК С ХРОНИЧЕСКИМ САЛЬПИНГООФОРИТОМ

Абрамова С.Н., Лазарева Г.А., Конопля А.А.

ГБОУ ВПО Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия
(305041, г. Курск, ул. К. Маркса, 3) abramovasvetlana@autorambler.ru

Исследования последних лет показали, что изменения местного иммунитета при воспалительных заболеваниях придатков у женщин, а точнее состояние вторичного иммунодефицита на локальном уровне, возникающее на фоне основного патологического процесса, являются следствием иммунного воспаления, нарушения структуры и функции клеточных мембран из-за перекисного окисления липидов. Целью исследования явилось установление изменений метаболического статуса при обострении хронического сальпингоофорита и выявление эффективности использования в комплексной фармакотерапии «Гефона» и различных лекарственных форм «Лонгидазы». Для этого под постоянным наблюдением находилось 69 женщин в возрасте от 20 до 35 лет с установленным диагнозом хронический сальпингоофорит в стадии обострения. Установлена эффективность использования иммунокорригирующих препаратов («Гефона» и «Лонгидазы») у больных хроническим сальпингоофоритом в стадии обострения в коррекции метаболических расстройств. Использование «Лонгидазы» в виде свечей оказывает корригирующее и нормализующее влияние на нарушенные показатели метаболического статуса у пациенток хроническим сальпингоофоритом на местном уровне, тогда как назначение инъекционной формы данного препарата нормализует параметры оксидантного статуса на системном уровне.

METABOLIC DISTURBANCES AND METHOD OF CORRECTION AT PATIENTS WITH CHRONIC SALPINGOOPHORITIS

Abramova S.N., Lazareva G.A., Konoplj A.A.

Kursk state medical university, Kursk, Russia (305041, Kursk, street K. Marksa, 3) abramovasvetlana@autorambler.ru

Researches of the last years showed that changes of local immunity at inflammatory diseases of appendages at women, to be exact a condition of a secondary immunodeficiency at the local level, arising against the main pathological process, are a consequence of an immune inflammation, violation of structure and function of cellular membranes because of lipid peroxidation. Research objective was establishment of changes of the metabolic status at an aggravation chronic salpingoophoritis and detection of efficiency of use in "Gepon's" complex pharmacotherapy and "Longidaza's" various medicinal forms. For this purpose under continuous supervision was the 69th women aged from 20 till 35 years with the established diagnosis chronic salpingoophoritis in an aggravation stage. Efficiency of use of immunocorrective preparations ("Gepon" and "Longidaza") at patients chronic salpingoophoritis in an aggravation stage in correction of metabolic frustration is established. "Longidaza's" use in the form of candles has corrective and normalizing impact on the broken indicators of the metabolic status at patients chronic salpingoophoritis at local level whereas purpose of an injection form of this preparation normalizes parameters of the oxidative status at system level.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПАРОДОНТА НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВИТАМИНА Е В КОМПЛЕКСЕ ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОМ ПАРОДОНТИТЕ

Аванесов А.М.¹, Кульченко А.А.², Меладзе З.А.¹, Арзуни В.А.¹, Цветкова Е.П.¹,
Мариничева Е.Г.¹, Чибисов С.М.¹

1 ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия
(117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6), e-mail: kalcna@mail.ru

2 ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», Саранск, Россия
(430005, г. Саранск, ул. Большевикская, 68)

В исследовании подчеркивается важность объективной оценки воспалительного процесса в тканях пародонта на фоне традиционного, а также применения комплексного патогенетического подхода в схемах лечебных мероприятий хронического генерализованного пародонтита средней степени тяжести. Хронический генерализованный пародонтит остается самой тяжелой и распространенной патологией пародонта. С прогрессом цивилизации распространенность заболеваний пародонта резко повысилась. До 80% населения (от 25 лет) имеет изменения тканей пародонта, в основе которых лежит единый патологический процесс – воспаление и дистрофия тканей пародонта. Недостаточная эффективность местного стоматологического лечения свидетельствует об актуальности этой проблемы, выходящей за рамки стоматологии, и имеет общемедицинское значение. На основании этого обосновано лечение этого заболевания с применением антиоксиданта витамина Е в комплексном медикаментозном воздействии.

ASSESSMENT OF THE CONDITION OF PERIODONTAL ON THE BACKGROUND OF APPLICATION OF VITAMIN E IN THE COMPLEX OF THERAPEUTIC MEASURES IN GENERALIZED PERIODONTITIS

Avanesov A.M.¹, Kulchenko A.A.², Meladse S.A.¹, Arsuni V.A.¹, Tsvetkova E.P.¹,
Marinicheva E.G.¹, Chibisov S.M.¹

1 Russian people friendship university, Moscow, Russia (117198, st. Mikluho-Maclay, 6), e-mail: kalcna@mail.ru
2 Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia (430005, Saransk, str. Bolshevik, 68), e-mail: 9023060@mail.ru

The study underscores the importance of the objective evaluation of inflammatory process in periodontal tissues on the background of traditional, as well as the application of complex pathogenetic approach in the schemes of medical

measures of chronic generalized periodontitis moderate severity. Chronic generalized periodontitis remains the most severe and widespread pathology of parodont. With the progress of civilization, the prevalence of periodontal disease has risen sharply. Up to 80% of the population (25 years and older) has a change of periodontal tissues, based on a single pathological process - inflammation and degeneration of fabrics of parodont. Lack of effectiveness of local dental treatment testifies to the topicality of this problem going beyond dentistry, and has no medical value. On the basis of this justified the treatment of this disease with the use of antioxidant vitamin E in the complex of medical exposure.

СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ И МОТИВАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЗА ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ

Аванесян Р.А., Сирак С.В., Ходжаян А.Б., Гевандова М.Г.

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет Минздрава России», Ставрополь,
Россия (355000, Ставрополь, ул. Мира, 310), e-mail: stgma@br.ru

В статье рассматриваются вопросы оказания стоматологических услуг в сфере дентальной имплантологии. Авторами статьи проведено социологическое исследование одновременно в двух типах стоматологических учреждений – анкетирование пациентов, обращающихся за имплантологической помощью в стоматологическую поликлинику № 1 г. Ставрополя, а также пациентов, обращающихся за подобной стоматологической помощью в коммерческую структуру – ООО НПО «Аполония» г. Ставрополя. С этой целью разработаны две специальные социологические анкеты. В обеих организациях проинтервьюировано 432 пациента. Результаты исследования показали, что возрастная-половая структура обращаемости населения в государственные и частные учреждения за имплантологической стоматологической помощью имеет как сходства, так и серьезные различия, связанные в основном с неоднородным социальным составом обратившихся и уровнем их доходов. Значительно различается и социальный состав обращающегося населения в указанные учреждения: в ГСП-1 преимущественно обращаются служащие и пенсионеры. В коммерческую структуру чаще обращаются предприниматели, а также служащие, но с более высоким уровнем дохода. Ведущим фактором обращаемости вне зависимости от типа учреждения является качество оказываемой в нем стоматологической помощи.

SOCIAL STRUCTURE AND MOTIVATION FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH IMPLANT DENTAL CARE

Sirak S.V., Khojayan A.B., Avanesyan R.A., Gevandova M.G.

Stavropol State Medical University, Stavropol, Russia (355000, Stavropol, street Mira, 310), e-mail: stgma@br.ru

The article deals with the provision of dental services in the field of dental implantology. By the authors conducted a case study at the same time in the two types of dental institutions – survey of patients seeking implantologicheskoy by the dental clinic number 1 in Stavropol, and patients seeking dental care in such a commercial structure – NPO “Apolonia” Stavropol. To this end, developed two special sociological survey. In both organizations interviewed 432 patients. Results of the study showed that the age and sex structure of requests in public and private institutions for the implant dental care has both similarities and important differences, mainly related to the heterogeneous social composition applied and the level of their income. Varies considerably, and the social composition of the population accesses the above institutions: in GSP-1 predominantly treated employees and retirees. In the commercial structure are turning entrepreneurs as well as employees, but with a higher level of income. The leading factor uptake, regardless of the type of institution is the quality provided therein dental care.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕРДЦА И СОСУДОВ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Агеев О.А.¹, Пурыгина М.А.², Милягин В.А.¹

¹ ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ,
Смоленск, Россия (214019, г. Смоленск, ул. Крупской, 28), olgamd2009@rambler.ru
² ОГБУЗ «Смоленская Областная клиническая больница», Смоленск, Россия
(214019, Смоленск, пр-т Гагарина, 27), e-mail: marina-purygina@rambler.ru

В статье рассматриваются вопросы комплексного обследования пациентов с АГ и ИБС. Целью исследования было оценить структурно-функциональные особенности сердца и сосудов эластического и мышечного типов у больных АГ и ИБС. В исследовании приняло участие 528 пациентов: 88 пациентов без клинических признаков АГ и ИБС, средний возраст $53,5 \pm 7,0$; 37 пациентов с ИБС без АГ, средний возраст $56,3 \pm 8,5$; 403 пациента с АГ (II–III степени) в сочетании с ИБС (стабильная стенокардия напряжения II–III ФК, постинфарктный кардиосклероз), средний возраст составил $56,1 \pm 7,2$ лет. Используются новые современные методы исследования: объемная сфигмография VASERA – SV1000 (Fukuda Denschi, Япония), СМАД («Пётр Телегин», Россия), ЭХОКГ Sonos-2500 (Hewlett Packard, США). Обосновывается значимость использования комплексного обследования для выявления больных с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений.