

In our study purulent-inflammatory wound complications in the control group consisted of 12 (23,1%) of the cases, in the main - 2 (4,3%) ($p < 0,05$). In the comparison group 2 (3,8%) patients had festering wounds. Festering wound in patients operated on by the proposed method was not. The presence of infiltration of the wound at 5 (9,6%) and 1 (2,2%) patients, hematoma - seroma of wound respectively in 4 (7,7%) and 1 (2,1%) patient. In 2 (3,8%) patients in the control group formed post-operative hernias, in the study group hernia formation was not observed.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ СТАТИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ

Сосницкая Д.М.¹, Байдина Т.В.²

1 ГБУЗ ПК «Пермский краевой госпиталь для ветеранов войн», Пермь, Россия
(614097, г. Пермь, ул. Подлесная, д. 6), e-mail: pkgvv@mail.ru

2 ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия им. академика Е.А. Вагнера
Минздравоохранения России», Пермь, Россия (614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 26), e-mail: rector@psma.ru

Изучено качество жизни больных дисциркуляторной энцефалопатией старческого возраста с головокружением и нарушениями статического равновесия по опроснику Short Form Health Survey 36 (SF-36). Выявлены социально-психологические предпосылки формирования эмоционально-аффективных расстройств. Обследовано 82 пациента с дисциркуляторной энцефалопатией 75-89 лет с жалобой на головокружение. Нарушения статического равновесия подтверждены методом компьютерной стабилотрии. Тревожно-депрессивные расстройства выявлены у 66 (80%) больных. Качество жизни было снижено у всех больных, при этом такие показатели, как физическое функционирование, ролевое (физическое) функционирование, общее здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, психическое здоровье и особенно ролевое (эмоциональное) функционирование были значительно хуже у больных с тревожно-депрессивной симптоматикой. В основе формирования эмоционально-аффективных расстройств лежали психогенные механизмы, связанные с нарушением социального функционирования. Не установлено существенной зависимости эмоционально-аффективных нарушений от таких характеристик, как пол, возраст, инвалидность, стрессогенные жизненные события, боль.

QUALITY OF LIFE IN SENILE CEREBROVASCULAR PATIENTS WITH STATIC DISEQUILIBRIUM AND SOCIO-PSYCHOLOGICAL RISK FACTORS OF EMOTIONAL-AFFECTIVE DISORDERS

Sosnitskaya D.M.¹, Baidina T.V.²

1 Perm Regional Hospital for War Veterans, Perm, Russia (6 Podlesnaya street, Perm 614097),
e-mail: pkgvv@mail.ru Подлесная, д. 6)

2 Perm State Medical Academy, Perm, Russia (26 Petropavlovskaya street, Perm 614000),
e-mail: rector@psma.ru, e-mail: rector@psma.ru

We studied the quality of life of patients with dyscirculatory encephalopathy elderly with dizziness and disorders of static equilibrium questionnaire Short Form Health Survey 36 (SF-36). Identified socio-psychological prerequisites for the formation of emotional and affective disorders. Examined 82 patients with dyscirculatory encephalopathy 75-89 years complaining of dizziness. Violations of static equilibrium are proved by the method of computer stabilometry. Anxiety-depressive disorders were detected in 66 (80%) patients. Quality of life was reduced in all patients, with indicators such as physical functioning, role physical functioning, General health, vitality, social functioning, mental health, and especially the role (emotional) functioning were significantly worse in patients with anxiety and depressive symptoms. The basis of the formation of the emotional-affective disorders were psychogenic mechanisms associated with impaired social functioning. Not installed essential dependence of the emotional-affective disorders such characteristics as gender, age, disability, life stress events, pain.

ОБОСНОВАНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

Сохощко И.А., Новокшенова И.Е., Турчанинов Д.В.

ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия» Минздрава России, Омск,
Россия (644043, г. Омск, ул. Ленина, 12), medecolog@yandex.ru

Дана количественная оценка, необходимая для ранжирования вклада отдельных факторов среды обитания в формирование здоровья населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Расчетные показатели самоочищающей способности природных сред региона оценены как пониженные. Анализ динамики показателя самоочищения позволил выявить особенности годового хода изменений показателя инверсий (максимальные значения отмечены в декабре и с августа по сентябрь). Получена количественная характеристика связи между исследуемыми факторами (среднегодовой концентрацией загрязняющих веществ, относительными величинами социально-гигиенических факторов, показателями обеспеченности медицинскими кадрами, при-